

NOTICE: INFORMATION DE L'UTILISATEUR

IBUPROFEN TEVA 5% GEL

ibuprofène

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Ibuprofen Teva et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Ibuprofen Teva
3. Comment utiliser Ibuprofen Teva
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Ibuprofen Teva
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Ibuprofen Teva et dans quel cas est-il utilisé ?

Le groupe pharmacothérapeutique

Ibuprofen Teva 5% gel fait parti des médicaments analgésiques et anti-inflammatoires du type non-stéroïdal.

Les indications thérapeutiques

Indiqué dans:

- tendinite des membres inférieurs et supérieurs.
- des lésions bénignes, particulièrement entraînées par la pratique sportive ou un accident, des entorses, des contusions des muscles et des tendons.
- le traitement est symptomatique et/ou de soutien.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Ibuprofen Teva ?

N'utilisez jamais Ibuprofen Teva

- si vous êtes allergique à l'ibuprofène ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Eviter tout contact avec les yeux et les muqueuses.
- Ne pas appliquer sur une lésion suintante, un eczéma ou une plaie.
- Ne pas utiliser Ibuprofen Teva 5% gel chez les enfants de moins de 12 ans, sauf avis médical.
- Pendant la grossesse.
- En cas de troubles inexplicables du processus de fabrication de sang.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Ibuprofen Teva.

- arrêter le traitement en cas d'apparition d'une éruption cutanée.
- la prudence est de mise si vous êtes allergique aux médicaments anti-inflammatoires qui ne sont pas dérivés de la cortisone, par exemple l'acide acétylsalicylique, l'ibuprofène.
- Ne pas utiliser sur les muqueuses ni dans les yeux.
- l'utilisation à long terme et à haute dose en rapport avec des affections qui ne sont pas mentionnées dans la présente notice peut provoquer des maux de tête. Ces maux de tête ne doivent pas être traités par des doses encore plus élevées.
- en cas de varicelle, il est conseillé d'éviter l'utilisation d'Ibuprofen Teva 5 % gel.
- si vous prenez déjà d'autres médicaments, veuillez lire également la rubrique "Autres médicaments et Ibuprofen Teva".

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Autres médicaments et Ibuprofen Teva

Jusqu'à présent, des interactions avec d'autres médicaments ne sont pas encore apparues.

Certains médicaments anticoagulants (contre la coagulation du sang) (par ex. acide acétylsalicylique/aspirine, warfarine, ticlopidine) peuvent affecter ou être affectés par le traitement par ibuprofène. Veuillez dès lors toujours demander conseil à votre médecin avant d'utiliser de l'ibuprofène avec d'autres médicaments.

Informez votre pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

Ibuprofen Teva avec des aliments, boissons et de l'alcool

Jusqu'à présent, des interactions avec des aliments ne sont pas encore apparues.

Incompatibilités

Incompatibilités peu probables lors d'usage normal.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

Ibuprofen Teva 5% gel n'est pas recommandé en cas de grossesse. Aussi chez les nourrissons et les petits enfants Ibuprofen Teva 5% gel ne peut pas être utilisé.

Allaitement

Ibuprofen Teva 5% gel n'est pas recommandé en cas d'allaitement maternel. Aussi chez les nourrissons et les petits enfants Ibuprofen Teva 5% gel ne peut pas être utilisé.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Ibuprofen Teva 5% gel n'a pas d'influence sur la conduite d'un véhicule et l'utilisation de machines.

Ibuprofen Teva contient de l'alcool benzylique

Ce médicament contient 10 mg/g d'alcool benzylique par dose. L'alcool benzylique peut provoquer des réactions allergiques. L'alcool benzylique peut provoquer une légère irritation locale.

3. Comment utiliser Ibuprofen Teva ?

Posologie et mode d'administration

Adultes et enfants à partir de 12 ans.

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre pharmacien en cas de doute.

Pour application locale.

3 fois par jour, appliquer 4 à 10 cm de gel (dépendant de la grandeur de l'articulation) sur la peau et faire pénétrer en massant doucement.

Gel à usage externe.

Le gel peut être isolé sous un bandage occlusif.

Si aucune amélioration n'apparaît, veuillez consulter à nouveau votre médecin.

Si vous avez utilisé plus d'Ibuprofen Teva que vous n'auriez dû

Si vous avez utilisé trop d'Ibuprofen Teva 5% gel, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoison (070/245.245).

Une intoxication est peu probable si les quantités prescrites sont bien respectées, en raison de la petite absorption dans le sang à travers la peau en comparaison avec une administration systémique (par exemples des comprimés).

Si vous oubliez d'utiliser Ibuprofen Teva

Si vous avez oublié une dose par inadvertance, appliquez-la dès que vous y pensez, mais n'appliquez pas de double dose.

Si vous arrêtez d'utiliser Ibuprofen Teva

Non applicable.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) :

On a constaté des réactions cutanées, plus souvent sous forme de rougeurs, de démangeaisons et d'une sensation de brûlure.

Sensibilité de la peau à la lumière.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé - Division Vigilance - Boîte Postale 97 - 1000 BRUXELLES Madou - Site internet : www.notifieruneffetindesirable.be - e-mail : adr@afmps.be.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Ibuprofen Teva ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Conserver à une température ambiante (15-25°C)

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après « EXP ». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Ibuprofen Teva

- La substance active est l'ibuprofène. Ibuprofen Teva contient 5 g d'ibuprofène par 100 g de gel.
- Les autres composants sont alcool isopropylique, hydroxyéthylcellulose, hydroxyde de sodium, alcool benzylique, eau purifiée (voir rubrique 2).

Aspect d'Ibuprofen Teva et contenu de l'emballage extérieur

Gel, pour application locale, incolore, translucide à légèrement trouble, odeur caractéristique d'isopropanol.

Tube de 50 g ou 120 g.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché

Teva Pharma Belgium S.A., Laarstraat 16, B-2610 Wilrijk

Fabricant

QUALIPHAR S.A., Rijksweg 9, B-2880 BORNEM

Numéro de l'Autorisation de Mise sur le Marché

BE179715

Mode de délivrance

Médicament non soumis à prescription médicale.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 04/2021.